

© MUDr. Ondrej Urban, Leg XP

Zverejnené 02. Apríla 2009

PSA = prostatický sérový antigén, v ľudovej reči je to enzým, ktorý ruzpúšťa rôsol. Produkujú ho prostatické bunky. V krvnom séru by sa nemal nachádzať, napriek tomu do určitej nano hladiny sa dá v krvi nájsť aj u zdravých mužov. Jeho normálna hladina je nastavená individuálne, podobne ako je to so všetkými biochemickými markermi v séru.

Po neprimeranom, násobkami zvýšenom náleze v krvnom séru začíname PSA hodnotiť ako ONKOMARKER !

IDENTIFIKÁCIA MKP:

Už jedno drobné ložisko MKP v prostate (*primárny, ohraničený, úplne eradikovateľný KP*) **dokáže výrazne zvýšiť hladinu PSA oproti individuálnej pôvodnej norme**, a zároveň mikrokarcinóm **môže byť nepovšimnutý MRI** aj napriek vysokej citlivosti MRI (*magnetická rezonancia*).

KLÚČ:

Krok 1.

Individuálne normovaná tabuľka hladiny PSA:

Polročne od 30. do 32. roku života muža vyšetrená hladina PSA v krvi. Celkom šesť výsledkov s odstupom pol roka.

Krok 2.

Screening PSA:

Odber krvi na zistenie hladiny PSA raz ročne, evidencia od 33. roku do 70. roku života.

INÁ MOŽNOSŤ:

NEEXISTUJE žiadna iná šanca identifikácie MKP v ohraničenom štádiu!

Zatiaľ a ešte stále, dodnes!

koniec