

© MUDr. Ondrej Urban, Leg XP

Zverejnené: 02. Apríla 2009

Môj názor a odporúčanie:

Uvedený preparát **ZD4054** NESKÚŠAŤ na liečbu KP ani „omylom“ !

POZOR:

V liečbe KP použitím **ZD4054** HROZÍ ZHORŠENIE STAVU !

Likvidácia zdravých kostných kapilár by bola HROZBA aj v prípade, že „volavkou“ pre nekrotizačné preparáty by bola tzv. „vysoká výživová apetencia“ v okolí KP.

Odhadujem 5-ročnú inkubačnú dobu vzniku nových roztrúsených ložísk po použití ZD4054.

Eliminácia zdravého tkaniva okolo KP síce povedie k izolácii tumoru, ale iba do času...

Detrit zo zaniknutého tumoru je mohutný bolus priónov, uvoľní sa ako nálož, lebo ohraničujúce živé okraje tumoru náhle nekrotizujú !

Bolusová diseminácia priónov je 100% katastrofa !

Poznámka na záver:

*S otázkou presného možného rozsahu zhoršenia stavu pokročilého KP po použití **ZD4054** sa bližšie nezaoberám, lebo **nekrotizácia nie je cesta eliminácie KP.** To je tvorba infekčnej nálože...*

Ak predsa len budeme chcieť nekrotizovať nádor...

Otázku otvoríme až potom, keď budem vedieť že „volavkou“ ktorá priťahuje nejaký nekrotizačný preparát je špecifický antigén typický pre KP a nekrotizujúca látka vyvolá najprv deaktiváciu (koaguláciu) génov vyvolávajúcich KP. Taká liečba bude mať zmysel, ale o takej zatiaľ niet chýrov.

koniec